
TIROSS®


TS1313






1.
ANALYTICAL

## ■ TO RECALL TEST RECORD



## ■ WARNING INDICATIONS




Low Battery Indication
The battery power is running low, please replace with a new battery.




Over-load Indication
The weighing subject on the platform exceeds the maximum capacity of scale. Please step off to avoid damage.




Low Fat% Indication
The Fat% is too low. Please lead a more nutritional diet and take good care of yourself.




High Fat% Indication
The Fat% is too high. Please watch your diet and do more exercise..




Re-test
Error exists, please re-test to get the correct result.






uj bater
str. 2) i um
ę na płaskie
odzę.


Wyświetl swoją wagę

[redacted] vinno przekraczać 2 kg.
[redacted] yć niemowlę, należy zważyć siebie, a następnie wziąć dziecko na ręce
[redacted] vagi. Od nowego wyniku ważenia należy odjąć poprzedni pomiar.





## ■ PONOWNE WYŚWIETLANIE WYNIKÓW POMIARU





## ■ ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ

**1. Informacje dotyczące indeksu Fat%**

- Indeks Fat% informuje o zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.
- Zbyt wysoka zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie może niekorzyst nie wpływać na metabolizm, powodując różne schorzenia. Potwierdza to starą zasadę „otyłość jest źródłem chorób".

**2. Zasady**

Sygnał elektryczny przepływający przez organizm napotyka na większy opór w tkance tłuszczowej niż w mięśniach i innych tkankach. Korzystając z tej zasady, można analizować opór tkanek przy użyciu prądu elektry cznego o bezpiecznej częstotliwości i niskim napięciu. Indeks Fat% jest zależny od oporu tkanek.

**3.Tabela zawartości tłuszczu/wody w tkankach**

Po wykonaniu pomiarów można skorzystać z tabeli referencyjnej.

| Wiek | Tłuszcz (K) | Woda (F) | Tłuszcz (M) | Woda (M) | Ocena | Wskaźnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0-16.0% | 66.0-57.8% | 4.0-11.0% | 66.0-61.2% | Zbyt chudy | |
| | | | | | Chudy | |
| ≤30 | 20.6-25.0% | 54.6-51.6% | 15.6-20.0% | 58.0-55.0% | Prawi-dłowy | |
| | | | | | Nad-waga | |
| | | | | | Otyłość | |
| | 4.0-20.0% | 66.0-55.0% | 4.0-15.0% | 66.0-58.4% | Zbyt chudy | |
| | | | | | Chudy | |
| | | | | | Prawi-dłowy | |
| | | | | | Nad-waga | |
| | | | | | Otyłość | |

wyłącznie informacje referencyjne. * W tabeli podano